

- W przypadku gdy pacjent przyjmuje leki rozrzedzające krew takie jak acard, aspiryna, polopiryna, etopiryna, polocard i inne zawierające kwas acetylosalicylowy należy odstawić po konsultacji z lekarzem kierującym na badanie 7 dni przed badaniem.
- Leki takie jak Clopidogrelem/ Plavix lub Tiklopidyną/ Ticlo, Aclostin - po konsultacji z lekarzem prowadzącym odstawić na 7-14 dni przed badaniem.
- Leczeni przeciwzakrzepowo muszą być przestawieni na leczenie heparyną drobno cząsteczkową i wykonanie badania INR dzień przed badaniem.
- Pacjenci chorujący na cukrzycę powinni być przygotowani do badania kolonoskopii pod kontrolą lekarza prowadzącego.
- Przed badaniem górnego odcinka przewodu pokarmowego pacjent powinien być około 6 godzin na czczo.
- Badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (kolonoskopia) wymaga bardziej specyficznego przygotowania. Zalecane jest stosowanie diety bezpestkowej na 7 dni przed badaniem i diety płynnej przez 2 dni poprzedzające badanie przyjęcie środka oczyszczającego jelito grube w dniu poprzedzającym badanie (pacjent powinien pić płyn aż do momentu całkowitego wypróżnienia. W przypadku, gdy jelito nie zostało całkowicie oczyszczone, wieczorem i rano w dniu badania wykonać enemę z ciepłej wody lub roztworu fizjologicznego. Warunkiem prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia kolonoskopii jest prawidłowe wyczyszczenie.